

Betadine®

Wondgaas met Betadine zalf (100 mg/g povidonjood)

Zalfgazen

Samenstelling:

Wondgaas met Betadine zalf (100 mg/g povidonjood).
Bevat ook: Macrogol 400, 4000 en 6000 en gezuiverd water.

Verpakkingsgrootten:

Betadine zalfgaas is verkrijgbaar in een doos met 10 of 50 apart verpakte wondgazen met Betadine zalf (10 x 10 cm).

Werking:

Betadine zalfgaas is een wondgaas geïmpregneerd met een vetvrije, ziektekiemdodende, verzachtende zalf met povidonjood, die een snelle en lang aanhoudende werking tegen bacteriën en schimmels heeft. Door de bruine kleur, die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van jodium, is de plaats zichtbaar waar gedesinfecteerd is. De desinfecterende werking van Betadine zalfgaas duurt voort zolang de bruine kleur zichtbaar is. Povidonjood is een desinfectans met een werking tegen een groot aantal micro-organismen. Ongevoeligheid van bacteriën voor povidonjood is niet waargenomen.

Te gebruiken bij:

Betadine zalfgaas wordt gebruikt voor de bescherming van de wond, zelfs als deze geïnfecteerd is. Dit gaas ontsmet de geïnfecteerde huid. Het bevordert de genezing van oppervlakkige brand-, snij of schaafwonden, zelfs indien de wond geïnfecteerd is en draagt bij aan het voorkomen van infecties.

NB: Bij ernstige en zwaar geïnfecteerde wonden is medische beoordeling en het gebruik van systemische antibiotica aangewezen.

Niet gebruiken bij:

- Pasgeborenen en te vroeg geboren baby's
- Langdurig gebruik op grote huidoppervlakten tijdens de zwangerschap
- Een overmatige schildklierwerking
- Jodiumovergevoeligheid

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

- Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
- Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- Voorzichtigheid is geboden bij personen met jodiumovergevoeligheid en schildklierafwijkingen.
- Betadine zalfgaas is niet te gebruiken ter voorkoming van tetanus.
- Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding:

Het is bekend dat jodium de placenta passeert en zo de foetus bereikt, waarbij grote hoeveelheden tot functionele stoornissen in de schildklier van de foetus kunnen leiden. Zwangere vrouwen moeten het gebruik van Betadine zalfgaas vermijden. Omdat jodium bij voorkeur in de moedermelk wordt uitgescheiden (tot aan 50%) kan zelfs toepassing van een kleine hoeveelheid leiden tot een hoge dosis vrij jodium in de moedermelk en remming van de schildklierfunctie van de baby veroorzaken. Na toepassing van Betadine zalfgaas dient de borstvoeding voor tenminste 24 uur te worden onderbroken.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken:

Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten.

Dosering en wijze van gebruik:

Wond reinigen, de huid rondom de wond reinigen en drogen. Gaas op de wond aanbrengen. Gaas bedekken met (ademend) verband en dit met tape aan de huid hechten. Verband dagelijks wisselen. Betadine zalfgaas niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder uw arts te raadplegen.

Mogelijke bijwerkingen:

Huidirritatie kan sporadisch voorkomen. Ook bij patiënten met een bekende jodiumovergevoeligheid veroorzaakt povidonjood slechts zelden huidirritaties. Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te brengen.

Bewaarcondities en houdbaarheid:

Bewaren op een donkere plaats en bij 15-25°C. De uiterste gebruiksdatum is vermeld op de verpakking achter "niet te gebruiken na" (maand/jaar).

Laatste revisie: July-2021



MEDA Pharma S.p.A. (a Mylan Company)
Via Valosa di Sopra, 9
20900 Monza - ITALY

Distributeur: Mylan Healthcare B.V., Krijgsmans 20, 1186 DM Amstelveen.

CE 0546

Legende van symbolen:



Fabrikant



Batch nummer



Niet opnieuw gebruiken

Mylan