

---

## CANESTEN FOOT

---

***Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Canesten foot zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.***

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig
- Raadpleeg uw arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

### *Inhoud van deze bijsluiter*

1. *Wat is Canesten foot en waarvoor wordt het gebruikt?*
2. *Wat u moet weten voordat u Canesten foot gebruikt*
3. *Hoe wordt Canesten foot gebruikt?*
4. *Mogelijke bijwerkingen*
5. *Hoe bewaart u Canesten foot?*

### **CANESTEN FOOT CRÈME, crème 10 mg/g** **CANESTEN FOOT STROOIPOEDER, strooipoeder 10 mg/g**

Werkzaam bestanddeel: clotrimazol.

Andere bestanddelen (hulpstoffen):

Canesten foot crème bevat de hulpstoffen: sorbitanstearaat (E491), polysorbaat 60 (E435), cetylstearylalcohol, cetylpalmitaat, 2-octyldodecanol, benzylalcohol, water.

Canesten foot strooipoeder bevat de hulpstof: niet-zwelbaar rijstzetmeel.

*Registratiehouder:* Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht,

*Voor inlichtingen:* Consumer Health Division, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht

*In het register ingeschreven onder RVG 23319: Canesten foot crème, crème 10 mg/g.*

*In het register ingeschreven onder RVG 08933: Canesten foot strooipoeder, strooipoeder 10 mg/g.*

## 1. Wat is Canesten foot en waarvoor wordt het gebruikt?

Canesten foot is een crème of strooipoeder en wordt gebruikt bij voetschimmel. Voetschimmel herkent u aan de rode kleur, schilfers of blaasjes op de huid en/of onaangename geur.

De producten bevatten als werkzaam bestanddeel clotrimazol. Clotrimazol is een stof, die in staat is de groei van veelvoorkomende schimmels te remmen of deze te doden.

Canesten foot crème is verkrijgbaar in een verpakking met een tube van 20 gram en van 50 gram. Canesten foot strooipoeder is verkrijgbaar in een verpakking met een strooibus van 30 gram.

Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel gebracht te worden.

Canesten foot crème kan worden gebruikt voor de behandeling van voetschimmel (zwemmerseczeem). Canesten foot strooipoeder wordt gebruikt ter ondersteuning en nabehandeling van de therapie met Canesten foot crème bij voetschimmel. Het strooipoeder is naast gebruik op de huid ook bestemd voor gebruik in sokken en schoenen (zie rubriek 3. *Hoe wordt Canesten foot gebruikt*)

## 2. Wat u moet weten voordat u Canesten foot gebruikt

### **Gebruik Canesten foot niet**

wanneer u overgevoelig bent voor clotrimazol of één van de overige bestanddelen van deze producten.

### **Wees extra voorzichtig met Canesten foot**

- wanneer u overgevoelig bent voor cetylstearylalcohol, omdat deze stof als hulpstof in de crème is verwerkt (zie de rubriek *Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Canesten foot*). Bij de eerste tekenen van een plaatselijke huidreactie moet het aanbrengen van Canesten foot worden stopgezet.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

### **Zwangerschap**

Canesten foot kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht in de aanbevolen dosering worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt/gebruikt.

### **Borstvoeding**

Voor zover bekend kan Canesten foot zonder bezwaar in de aanbevolen dosering worden gebruikt gedurende de periode van borstvoeding.

Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt/gebruikt.

### **Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Canesten foot**

De crème bevat cetylstearylalcohol. Dit kan plaatselijke huidreacties veroorzaken. (bijv. contactdermatitis).

### **Gebruik van Canesten foot in combinatie met andere geneesmiddelen**

Er zijn geen wisselwerkingen van dit product met andere geneesmiddelen bekend.

### **3. Hoe wordt Canesten foot gebruikt?**

Behandel de aangedane huid van de voet tweemaal per dag. U herkent deze door jeuk, rode kleur, schilfers of blaasjes op de huid of een onaangename geur. Was eerst uw voeten en verwijder loszittende huilschilfers. Droog de voeten goed af (vooral tussen de tenen). Gebruik hierbij een schone handdoek.

Breng Canesten foot dun aan op de aangedane huid van de voet en smeer deze uit. Canesten foot *crème* is gemakkelijk tussen de tenen en op de andere plaatsen van de voet aan te brengen.

Wanneer er blaasjes op de huid zitten die vocht afscheiden of wanneer de voeten sterk transpireren kunt u met Canesten foot *strooipoeder* de huid droog houden. Strooi eerst wat poeder op de huid en wrijf het dan licht in. Voor een optimale behandeling kunt u 's ochtends strooipoeder gebruiken (om de huid gedurende de dag droog te houden) en 's avonds crème.

Het verdient aanbeveling om dagelijks schone sokken te gebruiken en om wat poeder in de sokken te strooien. Omdat uw schoenen schimmelsporen kunnen bevatten afkomstig van losse huilschilfers is het mogelijk dat u op die manier opnieuw wordt besmet. Daarom wordt aangeraden om in uw schoenen dagelijks wat strooipoeder te strooien.

Als u bemerkt dat Canesten foot te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

#### **Hoe lang moet Canesten foot worden gebruikt?**

In het algemeen zullen de klachten na 3 tot 4 weken verdwenen zijn. Om de schimmels uit de diepere huidlagen te laten verdwijnen, is het belangrijk de behandeling niet te onderbreken en tot 2 weken nadat alle verschijnselen verdwenen zijn voort te zetten. Daarmee voorkomt u dat de schimmelinfectie weer terugkomt. Dit betekent dat de totale behandeling zo'n 6 weken zal duren.

Wanneer binnen twee weken geen duidelijke verbetering optreedt, of verergering optreedt, dient een arts te worden geraadpleegd.

#### **Wat u moet doen wanneer u teveel van Canesten foot heeft gebruikt**

Wanneer er teveel van Canesten foot is gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

#### **Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Canesten foot te gebruiken**

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip toepassen. Gebruik geen dubbele hoeveelheid Canesten foot om zo de vergeten dosering in te halen.

#### **Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Canesten foot wordt gestopt.**

Het is belangrijk om de behandeling tot 2 weken nadat alle verschijnselen verdwenen zijn voort te zetten. Als u te vroeg stopt met de behandeling is het mogelijk dat de schimmelinfectie weer terugkomt.

#### 4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Canesten foot bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen komen zelden voor.

##### Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Er kan overgevoeligheid of irritatie van de huid optreden gepaard gaande met jeuk, roodheid, branderig of stekend gevoel, blaasjes en vochtafscheiding. Verder kunnen galbulten ontstaan.

Waarschuw uw arts of apotheker wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

#### 5. Hoe bewaart u Canesten foot?

*Buiten bereik en zicht van kinderen houden*

Canesten foot strooipoeder: bewaren beneden 25°C.

Canesten foot crème: bewaren beneden 25°C en niet in de koelkast of vriezer bewaren.

##### **Uiterste gebruiksdatum**

Gebruik Canesten foot niet meer na de datum die op de verpakking is vermeld achter '*Niet te gebruiken na*'. Na het aanbreken van de tube is Canesten Foot crème 3 maanden houdbaar. Na het openen van de strooibus is Canesten Foot strooipoeder 12 maanden houdbaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

*Deze bijsluiter tekst is voor het laatst herzien in juni 2017.*